



Colgate®


Slip af med isninger
så simpelt som at slukke
på en kontakt



Nr. 1
mest anbefalede mundpleje
til sensitivitet af danske tandlæger*

Hvad er følsomme tænder eller isninger?

Isninger, også kendt som Dentin Hypersensitivitet, opstår, når tandens mikroskopiske kanaler (dentintubuli) blottlægges.



Åbne dentinkanaler

Kulde, varme eller luft kan udløse nerverne i tubuli og fremkalde skarpe smerter. For eksempel kan du føle smerte, når du spiser is (kulde) eller drikker te (varme).

Hvordan kan du undgå isninger?



Prøv at undgå syrlige fødevarer og kulsyreholdige drikkevarer.



Undgå overdreven tandbørstning og anvend en blød tandbørste.



Brug en tandpasta udviklet til at lindre isninger, såsom **Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF**.

Vælg Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF


100%

af patienterne oplevede:

- øjeblikkelig lindring³
- langvarig lindring⁴

Hvordan virker Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF?

Den unikke **PRO-ARGIN-teknologi** okkluderer blottede dentintubuli og forsegler dem med et beskyttende lag⁵, der giver øjeblikkelig¹ og langvarig² smertelindring



PRO-ARGIN-teknologi

For øjeblikkelig lindring:¹



Påfør tandpastaen direkte på det følsomme område med din fingerspids og massér blidt i et minut.

For langvarig lindring:²



Børst tænderne 2 gange om dagen med en blød tandbørste.



Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF

for øjeblikkelig¹ og langvarig²
lindring ved isninger i tænderne



Smertelindring ved isninger
+ forbedret syresensitivitet



Smertelindring ved isninger
+ beskyttelse af tandkød

**Scan QR kode og
find forhandler**



* Ipsos | Colgate Brand recommendation study 2025, Marts, 150 tandlæger » Uden Natriumlaurylsulfat skummemiddel

Referencer

1. For øjeblikkelig lindring, påfør direkte på den følsomme tand med en fingerspids og massér blidt i 1 minut, op til 2 gange dagligt og til børn 6-12 år 1 gang en uge eller sjældnere. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123-30. **2.** Ved fortsat brug 2x pr. dag. For varig lindring, påfør på en blød tandbørste og sørg for at børste alle følsomme områder af tænderne. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17-22. **3.** For øjeblikkelig lindring, påfør direkte på den følsomme tand med en fingerspids og massér blidt i 1 minut, op til 2 gange om dagen og for børn 6-12 år en gang om ugen eller sjældnere. Understøttet af en delanalyse af Nathoo S, et al. 2009. Data viser, at 42 forsøgspersoner ud af 42 (100 % eller 10 ud af 10) oplevede øjeblikkelig lindring på både taktile og luftforanstaltninger efter en enkelt direkte lokal påføring med fingerspidsen. Underanalyse af Nathoo S, et al. 2009 (CRO-2009-01-SEN-IARG2-ED; Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):123-30). **4.** Ved fortsat brug 2x pr. dag. For varig lindring, påfør på en blød tandbørste og sørg for at børste alle følsomme områder af tænderne. Understøttet af en underanalyse af Docimo R, et al. 2009. Klokken 4 uger opnåede 40 ud af 40 forsøgspersoner (100 % eller 10 ud af 10) varig lindring på både taktile og luftblæsningsforanstaltninger. Delanalyse af Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17-22. **5.** Liu Y, et al. J Dent Res. 2022;101(Spec Iss B):80.