



Slip af
med isninger
så simpelt
som at slukke
en kontakt



#1
mest anbefalede
mundpleje til
sensitivitet af
danske tandlæger[®]

Colgate[®] SENSITIVE INSTANT RELIEF
med PRO-ARGIN-teknologi

KLINISK BEVIST TIL AT GIVE ØJEBLIKKELIG^{†1} OG LANGVARIG^{†2} SMERTELINDRING

Dentin hypersensitivitet (DHS): et kronisk problem^{3,4}

77% danskere
lider af dentin
hypersensitivitet
fra tid til anden.
25% hver uge.⁵

**Derfor er det essentielt
at identificere og
behandle DHS hos
dine patienter⁶**



**Øjeblikkelig^{*1} og langvarig^{†2} lindring med
Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF**



**100% af patienterne oplevede
øjeblikkelig smertelindring^{‡7}**



42 af 42



Test med lufttryk



Taktil test



**100% af patienterne oplevede
langvarig smertelindring^{§8}**



40 af 40




Test med lufttryk




Taktil test

Unik PRO-ARGIN teknologi med Zinkkomponenter

PRO-ARGIN teknologi
forsegler åbne tubuli og danner
et stærkt calciumrigt lag⁹



Repair + Enamel Strength
Zinkfosfat
giver hurtigere opbygning
af det beskyttende lag^{#10}
og øget syreresistens^{††}



Zn^{2+}


Repair + Gum care
Zinkkomponenter
styrker tandkødet og
forebygger recession***



Uovertruffen okklusion vs. en konkurrerende teknologi¹²

Tinfluorid /
Natriumfluorid
teknologi

52%
okklusion med
konkurrerende
teknologi



PRO-ARGIN
teknologi

81%
okklusion med
Colgate®
SENSITIVE
INSTANT Relief

Anbefal Colgate® SENSITIVE INSTANT RELIEF til patienter med mild til svær Dentin hypersensitivitet



Smertelindring ved
isninger^{††}
+ forbedret syreresistens



Smertelindring ved
isninger
+ beskyttelse af tandkød



Øjeblikkelig*¹ og langvarig^{†‡} lindring
med Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief
- klinisk dokumenteret



Scan her og bestil gratis patientprøver
på ColgateProfessional.dk

♦ Ipsos | Colgate Brand recommendation study 2025, Marts, 150 tandlæger *For øjeblikkelig lindring, påfør direkte på den følsomme tand med en fingerspids og massér blidt i 1 minut, op til to gange om dagen og til børn 6-12 år en gang om ugen eller sjældnere. †Ved fortsat brug 2 gange om dagen. For varig lindring, påfør på en blød tandbørste og sorg for at børste alle følsomme områder af tænderne. ‡For øjeblikkelig lindring, påfør direkte på den følsomme tand med en fingerspids og massér blidt i 1 minut, op til to gange om dagen og for børn 6-12 år en gang om ugen eller sjældnere. Understøttet af en delanalyse af Nathoo S, et al. 2009. Data viser, at 42 forsøgspersoner ud af 42 (100 % eller 10 ud af 10) oplevede øjeblikkelig smertelindring ved både taktil og luftpåvirkning efter en enkelt direkte lokal påføring ved hjælp af fingerspids og massage. § Ved fortsat brug 2x pr. dag. For varig lindring, anvend en skånsom tandbørste, der sørger for at børste alle følsomme områder af tænderne. Understøttet af en subanalyse af Docimo R, et al. 2009. Efter 4 uger, 40 ud af 40 forsøgspersoner (100 %, 10 ud af 10) opnåede varig smertelindring ved både taktil og luftpåvirkning. #I forhold til tidligere formel, in vitro okklusion efter 3x tandbørstning. ¶I forhold til tidligere formel, in vitro syreresistens efter 5x tandbørstning. **Efter 4 ugers fortsat brug. >Natriumlaurylsulfat

1. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):123-30. 2. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(1):17-22. 3. Davari AR, et al. Dent Shiraz Univ Med Sci. 2013;14(3):136-45. 4. Dam VV, et al. Open Dent J. 2022;16:e187421062201130. 5. Addy, Dent Clin North Am 1990;34:503-51.

6. Canadian Advisory Board, J of Can Dent Assoc. 2003. 7. Subanalysis of Nathoo S, et al 2009 (CRO-2009-01-SEN-IARG2-ED; Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):123-30). 8. Subanalysis of Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):17-22. 9. Liu Y, et al. J Dent Res. 2022;101(Spec Iss B):80. 10. Data on File. Hines D. Colgate-Palmolive Technology Center, 2021. 11. Lai HY, et al. J Clin Periodontol. 2015;42:S17. 12. Pro-Argin Technology vs Stannous fluoride / Sodium fluoride technology, In vitro study, confocal images after 5 treatments, Liu et al. J Dent Res. 2022;101(Spec Iss B):80.